

**Proline pak** to kombi pak złożony z Proline 250EC i Horizonu 250EW.

To nowość w ochronie rzepaku. Z nową substancją **JAU** i z nowymi możliwościami. **JAU** działa skutecznie na wszystkie choroby kwitnienia i wykazuje niespotykaną dotąd skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco, przez co jest bardzo elastyczny w stosunku do terminu stosowania. Dzięki równomiernemu i trwałemu rozmieszczeniu w liściu wykazuje zwiększoną odporność na zmywanie i długi okres działania. **JAU** wykazuje dodatkowy efekt plonotwórczy, dzięki pozytywnemu wpływowi na procesy fizjologiczne rośliny - niezależnie od zwalczania chorób.

Zwiększający się udział rzepaku w plodozmianie oraz duża liczba oferowanych do siewu odmian (w 2005 roku było ich 46) wymusza bardziej techniczne podejście do ich ochrony. Poszczególne z nich różnią się między innymi: pochodzeniem, tempem rozwoju, wysokością oraz podatnością na choroby.

Aby sprostać tym wymaganiom Bayer CropScience opracował kilka nowoczesnych technologii uzależnionych od problemów i możliwości producentów rzepaku.

Przedstawiamy dwa z nich.

### 1. Kompleksowy program z efektem regulacyjnym


#### Kompletny program przeznaczony do technologii intensywnej.

Zapewnia lepsze przetrzymywanie, regulację pokroju i zwalczanie chorób.

A. Jesienią stosujemy Horizon 250EW w fazie 4-8 liści.

B. Wiosną stosujemy Horizon 250EW w początkowym okresie wzrostu pędu głównego. Zwalczamy choroby oraz zapobiegamy wyleganiu.

C. **Proline pak** stosujemy w kwitnieniu w celu efektywnego zwalczania chorób.



Względy ekonomiczne plantatorów, brak konieczności regulacji pokroju niektórych odmian oraz stosunkowo wysoka skuteczność zwalczania chorób przez **Proline pak** w niższych dawkach, pozwalają pokusić się o zastosowanie programu opartego na dawkach dzielonych.


### 2. Program bez efektu regulacyjnego-dawki dzielone

#### Program do ochrony fungicydowej niskich odmian rzepaku.

A. Jesienią stosujemy Horizon 250EW w fazie 4-8 liści.

B. Wiosną stosujemy **Proline pak** w okresie wzrostu pędu głównego. Zwalczamy choroby. Gdy głównym problemem jest Phoma lingam i Alternaria zabieg wykonujemy w fazie BBCH 32-33. Gdy zaś Sclerotinia to opóźniamy zabieg do fazy BBCH 50.

C. **Proline pak** stosujemy w kwitnieniu w celu zwalczania chorób.



Wprowadzenie **Proline paku** przyczyni się z pewnością do poprawienia efektywności w zwalczaniu chorób w tak trudnej i wymagającej uprawie, jaką niewątpliwie jest rzepak ozimy.