

Ostatni rok w sprzedaży!



wyeliminuje chwasty

w jednym wczesnym zabiegu

Przez wiele lat najbardziej popularnym sposobem walki z chwastami były zabiegi preparatami zawierającymi atrazynę. Te czasy powoli mijają. Rok 2007 jest ostatnim rokiem sprzedaży produktów opartych na atrazynie w tym także **Merlina Super**. Wieloletnie stosowanie atrazyny doprowadziło do wytworzenia się chwastów odpornych na tą substancję, w wielu rejonach kraju. Dzięki właściwościom tej substancji, rolnik mógł w sposób łatwy, tani i bezpieczny dla rośliny uprawnej zwalczyć lub ograniczyć występowanie wielu uciążliwych chwastów.

W składzie produktu **Merlin Super** obok atrazyny znalazła się inna substancja aktywna isoxaflutol - **IFT**. Stanowiła doskonałą bazę dla produktu Merlin i będzie towarzyszyła nam w kolejnych latach jako baza produktu następcy **Merlina Super** o nazwie **BOREAL 58 WG***.

Merlin Super będzie dostępny jeszcze w sezonie 2007 i będzie to ostatni sezon sprzedaży, dlatego serdecznie zachęcam do zakupu i stosowania tego produktu.

Warto kupić i warto stosować Merlin Super 537 SC!

- **Jest skuteczny** - eliminuje chwasty (również uodpornione na atrazynę). Pobierany jest zarówno przez korzenie jak i nadziemne części wschodzących chwastów. Działa szybko. Wysoka skuteczność **IFT** została szybko zauważona i doceniona w wielu krajach takich jak: Francja, Hiszpania, Węgry i USA, gdzie kukurydza jest znaczącą uprawą. W krajach tych herbicydy oparte na **IFT** należą do najbardziej popularnych.

- **Wcześnie eliminuje chwasty** – może być zastosowany po siewie kukurydzy lub wcześniej po wschodach. Zastosowany po siewie, dzięki dobremu działaniu doglebowemu **IFT**, zwalcza chwasty będące w bardzo wczesnych stadiach oraz nie dopuszcza do wschodów nowych. Stwarza to bardzo korzystne warunki dla wzrostu kukurydzy we wczesnych fazach rozwoju, kiedy ze względu na powolny początkowy jej wzrost jest narażona na mocną konkurencję znacznie szybciej rosnących w tym czasie chwastów (komosa biała, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna i inne).

- **Jest łatwy w stosowaniu**. Polecamy stosowanie standardowej dawki 1,5 l/ha przy obu zalecanych terminach, zalecana ilość cieczy roboczej 200-300 l/ha,

oprysk średniokroplisty, nie wymaga mieszania z innymi substancjami i ze względu na bezpieczeństwo lepiej jest tego nie robić, ciecz roboczą najlepiej wykorzystać zaraz po jej przygotowaniu, przy dłuższym przetrzymywaniu w zbiorniku może dojść do nieprzewidzianych reakcji chemicznych.

- **Jest selektywny dla kukurydzy** zastosowany prawidłowo z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad stosowania: w przypadku utrzymującej się suszy nie należy stosować **Merlina Super** ani innych preparatów o działaniu odglebowym, ze względu na ich ograniczoną w tych warunkach skuteczność. Należy również unikać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami lub gdy jest bardzo gorąco (warunki stresowe), szczególnie na glebach lekkich, unikać zabiegów w warunkach suszy glebowej – ponieważ gwałtowne deszcze mogą wywołać przemieszczenie całej substancji aktywnej w strefę korzeni i spowodować szybkie pobranie zbyt dużych ilości substancji aktywnej przez roślinę uprawną. Nie należy stosować razem z olejem i nie mieszać z innymi preparatami.

- **Zwalczy większość chwastów na plantacji**. Znajomość zakresu działania herbicydu jest bardzo ważna, dzięki temu możemy dopasować herbicyd do naszych potrzeb. Jednak, gdy nie jesteśmy pewni co do składu chwastów, które mogą zagrażać kukurydzy, szczególnie przy zabiegach wykonywanych przed ich wschodami, dobrze jest mieć pod ręką preparat, który radzi sobie z wieloma gatunkami chwastów. **Merlin Super 537 SC** spełnia te wymogi.

W roku 2008 wprowadzimy na rynek produkt o podobnym spektrum działania, oparty także na isoxaflutolu **IFT**, ale nie tylko... produkt przedwschodowy, do stosowania na wilgotna glebę - **BOREAL 58WG***

Sławomir Kaszubowski
Bayer CropScience

* produkt w końcowej fazie rejestracji



Bayer CropScience