

# Drzyjcie, szkodniki!

Zapowiadana rejestracja nowego insektycydu dobiegła końca. Proteus 110 OD będzie można stosować już w tym sezonie w wielu uprawach.

**P**roteus 110 OD to środek owadobójczy, który ma nową formułę O-teq. Preparat w tej formułej ma postać emulsji, dzięki olejowemu dodatkowi dyspersyjnemu. Zdaniem producenta, zwiększa to jego skuteczność, a także ułatwia pobieranie przez rośliny. Preparat działa przez kontakt ze szkodnikiem i dociera do jego żołądka. Zawiera dwie substancje aktywne: tiachlopryd i deltametrynę. Zwalcza szkodniki gryzące i kłująco-ssące. Środek stosuje się w następujących uprawach:

- ♦ **ziemniaków** – przeciwko larwom i chrząszczom stonki ziemniaczanej, w dawce 0,3–0,4 l/ha.

Opryski wykonuje się po pojawieniu się szkodnika. Należy jednak pamiętać, że nie można ich robić przed pojawieniem się pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych.

- ♦ **rzepaku ozimego** – w dawce 0,5–0,6 l/ha. Przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi stosuje się go przed złożeniem jaj przez chrząszcze, ale nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodyg. Zwalcza też słodyszka rzepakowego, kiedy tylko pojawi się on na roślinie (od momentu zwartego kwiatostanu do luźnego pąka). Proteus 110 OD zwalcza również kolejnego szkodnika – chowacza czterozębnego. Aplikację środka prowadzi się też w początkowym okre-

sie opadania płatków kwiatowych na szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, przyszczarek kapustnik).

- ♦ **buraków cukrowych**

– w tym przypadku dawka jest wyższa i wynosi 0,5–0,75 l/ha. Preparat aplikuje się, kiedy na plantacji pojawią się mszyce (trzmielinowo-burakowa, brzoskwinio-ziemniaczana). Zabiegu nie wykonuje się później niż do momentu, gdy liście rozety zakrywają 50 proc. powierzchni gleby.

- ♦ **kukurydzy** – w dawce 0,5 l/ha przeciwko ploniarce zbożowce, kiedy długość trzeciego liścia jest równa długości drugiego. Można nim także „potraktować” omacnicę prosowiankę w chwili pojawiania się szkodników, w okresie wyrzucania wiech. 🌿 (mm)

