

Sady

Program ochrony



▶ Marzec

▶ Kwiecień

▶ Maj

▶ Czerwiec

▶ Lipiec

▶ Sierpień

Pomarsol® Forte

Pomarsol® Forte

Decis®

Calypso®

Folicur® Multi*

Folicur® Multi*

Euparen® Multi*

Euparen® Multi*

Pomarsol® Forte
Parch, drobna plamistość liści, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych.
45 g środka w 10 l wody.
Środek stosować co 10-14 dni, jednak nie częściej niż dwukrotnie przed zbiorem.

Folicur® Multi*
Parch.
20 g środka w 10 l wody.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie, od fazy różowego pąka kwiatowego.
* Zapobiegawczo – co 7-10 dni do czerwcowego opadania zawiązków, później w odstępach co 10-14 dni.
* Interwencyjnie – do 96 godzin po infekcji.

Decis®
Piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, owocówki, miodówki, namiotnica gruszowa, mszyce, wznosik doparek, zwójka koroweczek, kwiecieciaki.
4 ml środka w 10 l wody.

Euparen® M*
Parch, szara pleśń.
20 g środka w 10 l wody.
Środek można stosować przez cały sezon wegetacyjny co 7-14 dni.
Opryskiwać w pełni i pod koniec kwitnienia w zależności od nasilenia choroby.
Koniec fazy kwitnienia to podstawowy termin zwalczania szarej pleśni.
Przedziorki i szpeciele.
Wykonanie jednego zabiegu Euparenem Multi przeciwko chorobom grzybowym jabłoni i gruszy obniża liczebność populacji przedziorków i szpecieli.
Wykonanie kolejnych zabiegów ogranicza populację tych szkodników często do poziomu niższego od progu ich szkodliwości.

Folicur® Multi*
Mączniak prawdziwy.
25-30 g środka w 10 l wody.
Wyższą dawkę środka stosować na odmianach wrażliwych.
Środek stosować zapobiegawczo, 2-3 razy w sezonie, w okresie infekcji wtórnych.

Calypso®
Mszyca jabłoniowa – bawkowa.
3-4 ml w 10 l wody.
Inne gatunki mszyc.
2 ml w 10 l wody.
Kwieciak jabłkowiec – 3 ml w 10 l wody, owocówka jabłkoweczka, zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście – 4 ml w 10 l wody.
Pierwszy zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników. Oceny zagrożenia można dokonać za pomocą pułapek lepowych.
Uwaga: środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce – do około 21 dni po zabiegu.

Euparen® M*
Choroby przechwalnicze: gorzka zgnilizna oraz ograniczanie mokrej zgnilizny i szarej pleśni.
20 g na 10 l wody.
Opryskiwać na 2 tygodnie przed zbiorem owoców.



Ilość wody dostosować do wielkości drzew. Zabieg wykonać tak, aby cała korona drzewa została dokładnie opryskana.

* Sprzedaż i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

