


Truskawki

Program ochrony



Początek wegetacji

Przed kwitnieniem

Biały pąk

Kwitnienie

Po kwitnieniu

Między zbiorami

Euparen® M*

Pomarsol® Forte

Teldor®

Decis®

Decis®

Kwieciak malinowiec.
5 ml środka w 10 l wody.
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek.

Pomarsol® Forte

Szara pleśń, biała plamistość liści.
20 g środka w 10 l wody.
Zabiegi przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek. Pierwsze opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następnie co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony.

Euparen® M*

Szara pleśń oraz ograniczanie białej plamistości liści, czerwonej plamistości mączniaka prawdziwego i skórzastej zgnilizny owoców.
25 g na 10 l wody.
Zabiegi przeprowadzać w fazie kwitnienia truskawek. Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia, następne w odstępach co 7 dni, aż do końca kwitnienia. Przędziorki.
Wykonanie jednego zabiegu Euparenem Multi 50 WG przeciwko chorobom truskawek obniża liczebność przędziorków. Wykonanie kolejnych zabiegów ogranicza populację szkodnika do poziomu niższego od prądu ich szkodliwości.

Teldor®

Szara pleśń.
15 ml w 10 l wody.
Ze względu na krótki okres karencji (1 dzień) można stosować środek tuż przed i pomiędzy zbiorami.



* Sprzedaż i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.